

Szczepienia obowiązkowe - bezpłatne

	Wiek	Szczepienie przeciw
1 rok życia	w ciągu 24 godzin po urodzeniu	WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) Gruźlicy - śródskórnie szczepionką BCG
	2 miesiąc życia (6-8 tygodni)	WZW typu B - domięśniowo (druga dawka) BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (pierwsza dawka) Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (pierwsza dawka) PNEUMOKOKOM (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) - domięśniowo lub podskórnie; niemowlętom podaje się szczepionkę skoniugowaną (pierwsza dawka 7.-8. tydzień)
	Przełom 3 i 4 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (druga dawka) POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (pierwsza dawka) Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (druga dawka) PNEUMOKOKOM (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) - domięśniowo lub podskórnie; niemowlętom podaje się szczepionkę skoniugowaną (druga dawka)
	5. - 6. miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (trzecia dawka) POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (druga dawka) Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (trzecia dawka)
	7 miesiąc życia	WZW typu B - domięśniowo (trzecia dawka)
2 rok życia	13 - 14 miesiąc życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (typu MMR) (pierwsza dawka) PNEUMOKOKOM (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) - domięśniowo lub podskórnie (dawka przypominająca)
	16 - 18 miesiąc życia	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (czwarta dawka) POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (trzecia dawka) Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (czwarta dawka)

Szczepienia zalecane - dodatkowo płatne

	Wiek	Szczepienie przeciw
od 1 do 2 roku życia	od 6 do 24 tygodnia życia	BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ - doustnie; dawkowanie wg wskazań producenta
	2 miesiąca życia	Zakażeniom MENINGOKOKAMI (NEISSERIA MENINGITIDIS) - domięśniowo lub podskórnie; niemowlętom podaje się szczepionkę skoniugowaną; dawkowanie wg wskazań producenta